

- Brunstäusserung: gut schlecht
 Brunstdauer: kurz normal lang
 Schleim: oft selten
 viel wenig
 klar trüb
- KB Natursprung eigener Stier fremder Stier
 Zeitpunkt der Besamung: Anfang Mitte Ende der Brunst

Erstmaliges Zulassen

- der Rinder nach: Alter: Gewicht: Jahreszeit:

Tiergesundheit (Bitte Anzahl Tiere angeben, die während der letzten 12 Monate von Krankheit betroffen waren)

- Sterilität: Stille Brunst:
 Azyklie:
 Zysten:
 Umrindern:
 Scheidenausfluss:
 Gebärmutterentzündung:
- Puerperium: Nachgeburtverhalten:
- Aborte: Frühaborte Spätaborte
 Alter der Foeten:
- Metabolismus: Hypokalzämie (Milchfieber):
 Azetonämie:
 Hypomagnesiämie (Weidetetanie):
- Mastitis: akute Mastitiden chronische Mastitiden
- Klauenleiden: Klauenrehe Klauengeschwür
 lose Wand
- andere Krankh.:
 Parasiten: Leberegel andere:

 Kälberkrankh.: Weissmuskelkrankheit Durchfall:
 Lungenentzündung andere:

Bemerkungen:.....
