

Behandlungsempfehlung Mortellaro


Aktive Läsionen **Ansteckend!**



M1: Veränderung < 2cm

→ Repiderma[®] Spray/Intra Hoof fit[®] Gel

Verband für 5 Tage



M2: Veränderung > 2cm, schmerzhaft!

→ Novaderma[®] Paste/Intra Hoof fit[®] Gel

Verband für 5 Tage dann erneut beurteilen!*




M4.1: Chronisch mit neuen, kleinen Veränderungen

→ Novaderma[®] Paste/Intra Hoof fit[®] Gel

Verband für 7 Tage dann erneut beurteilen!*

Abheilungsstadium



M3: Krustenbildung

→ Nachkontrolle ev. Repiderma[®] Spray

Chronisches Stadium



M4: Hufeisenförmig verdickte Haut oder flache Veränderung mit langen Haaren

→ Regelmässige Kontrolle, falls nötig Repiderma[®] Spray

*Verbandswechsel alle 7 Tage bis zur Abheilung;
Novaderma Paste nur auf Wunde und rund herum eine Schicht Melkfett aufbringen, zum Schutz der gesunden Haut

Empfohlene Produkte

Intra Hoof fit® Gel:



Intra Repiderma® Spray:



Novaderma® Paste:



Für Fragen zu den Produkten und Bestellmöglichkeiten nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter der 031 431 22 60 oder rgdssb@vetsuisse.unibe.ch

Stand: Februar 2020